


# Češi a kožní a nehtové mykózy v jarním a letním období

Více jak polovina z těch, kteří trpěli příznaky typickými pro mykózu, je za toto onemocnění neoznačila.



## Čechy, kteří trpěli příznaky typickými pro mykózu...

...nejvíce trápilo svědění a začervenání, potýkali se ale i s řadou jiných projevů.



Ti, kteří věděli, že za jejich problémy stojí mykotické onemocnění, nejčastěji uváděli výskyt na nohou a chodidlech. Nebylo ale výjimkou, že se příznaky vyskytovaly současně na více místech na těle...



...v průměru jim trvalo 21 dní, než projevy začali řešit. S léčbou se ale nevyplácí otálet. Pokud mykotické onemocnění zasáhne více jak 25 % nehtu, není zpravidla možné jej vyřešit lokálně a na řadě je náročnější léčba.\*\*\*

\*Zdroj dat: Výzkumná agentura Ipsos, Léčba mykóz, závěrečná zpráva září 2018, reprezentativní průzkum, vzorek je reprezentativní podle hlavních sociodemografických charakteristik (pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa bydliště), ČR populace 18–65, vzorek pro rekruční část tvořilo 3 150 respondentů, vzorek pro hlavní sběr dat tvořilo 833 respondentů, realizace sběru dat 15. 8. 2018 – 5. 9. 2018, respondenti byli dotazováni na poslední půtok, tzn. na období cca březen–srpen 2018).

\*\*Za posledních 6 měsíců (březen – srpen 2018).

\*\*\*Jedličková A, Mašata J, Skořepová M. Lokální mykózy. Praha, Jessenius Maxdorf, 2008. In Litvík, M. Lokální a systémová léčba onychomykóz – doporučení pro praxi. Remedia. Praha: 2009. <http://www.remedia.cz/Clanky/Farmakoterapie/Lokalni-a-systemova-lecba-onychomykoz-doporučení-pro-praxi/6-L-xj.magarticle.aspx>

EXODERIL® 10 mg/g krém a EXODERIL® 10 mg/ml kožní roztok jsou volně prodejné léky k vnějšímu použití obsahující naftifin. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.